NUOVE SPECIE DI UCCELLI

DELLE ISOLE ARU E KEI

RACCOLTE DA

ODOARDO BECCARI

E DESCRITTE DA

TOMMASO SALVADORI

—

Il Wallace ed il Rosenberg hanno fatto molto per la conoscenza degli animali delle Isole Aru, e delle Kei; tuttavia molto resta da fare. Recentemente anche il Beccari ha visitato quelle isole e le sue collezioni ricchissime sono splendido ornamento del Museo Civico di Genova. La raccolta ornitologica, fatta dal Beccari, consta di circa 1000 individui appartenenti a circa 160 specie. Essa sarà argomento di un lavoro speciale, che mi propongo di fare in seguito; per ora mi limito a descrivere alcune specie, che mi paiono nuove.

Cychlopsitta arucnsis, n. sp.

Psittacula diophthalmus (!), G. R. Gr., P. Z. S. 1858, p. 195 (*partim*).

Psittacula diophthalma, G. R. Gr. (nec Hombr. & Jacq.), List Sp. B. Brit. Mus. III, 2, *Psittacidae*, p. 90 (1859). — Id., Cat. B. New Guin. pp. 42, 60 (*partim*) (1859). — Id., P. Z. S. 1861, p. 437. — Schleg., Mus. P. B. *Psittaci*, p. 75 (*partim*) (1864). — Id., Ned. Tijdschr. v. Dierk. III, p. 231 (*partim*) (1866). — Finsch, Die Papag. II. p. 628 (*partim*) (1868).

Opopsitta diophthalma, Rosenb., Journ f. Orn. 1862, p. 65. — Id., Naturl. Tijdschr. v Nederl. Ind. 1863, p. 226 (*partim*)

Mas. *Mari* C. DIOPHTHALMAE *simillimus, sed colore rubro capitis pallidiore; vertice vix flavicante; macula cyanea anteoculari minori et pallidiori; macula azurea subgenali magis antice protracta.*

Foem. *Deest omnino ruber color capitis; fronte et regione suboculari cyaneis; genis griseis, subtus azureo-circumdatis.*

Long. tot. 0m, 160; al. 0m, 088; caud. 0m, 050; rostr. 0m, 015; tarsi 0m, 010.

Maschio. Color dominante verde, volgente un poco al giallo sulle parti inferiori; sincipite, redini, gote e regione auricolare di color rosso; sul vertice, presso il confine del rosso, una traccia di giallo; al disopra ed al davanti degli occhi una macchia azzurro-oltremare; sotto il rosso delle gote una macchia a guisa di largo margine azzurro, che si estende fin sul mento; fianchi gialli; 1a remigante nera, le altre bruno-nere, col pogonio esterno azzurro; le secondarie hanno una macchia gialla presso la base del pogonio interno; le terziarie sono verdi e le ultime hanno il pogonio interno rosso; cuopritrici superiori delle ali verdi; le inferiori di color verde, volgente al giallo, tranne le maggiori, che sono nericcie, con una macchia gialla sul pogonio interno; coda verde; piume del sottocoda verdi, coi margini volgenti al giallo.

Femmina. Differisce dal maschio pel colorito della testa, sulla quale non v' ha traccia di rosso. Sincipite, redini e una stria, che si estende fin sulle piume auricolari, azzurro-oltremare chiaro; gote grigie, marginate inferiormente da una larga fascia azzurra, come nel maschio (1).

Hab. Isole Aru (*Wallace, von Rosenberg, Beccari*).

Lo Schlegel ha fatto già notare che gl' individui femmine delle Isole Aru, riferiti finora alla *C. diophthalma,* differiscono da quelli di Mysol e di altre regioni, per vari caratteri, e specialmente per la mancanza di color rosso sulla testa. Il Beccari ha inviato due soli individui di Lutor nelle Isole Aru;

(1) Il becco, tanto del maschio, quanto della femmina, è bianchiccio colla punta scura, ma probabilmente per causa del disseccamento.

essi sono maschio e femmina, e confermano l'osservazione dello Schlegel, per cui non ho esitato a considerarli come appartenenti ad una specie distinta, rappresentante nelle Isole Aru la *C. diophthalma* della Nuova Guinea, di Mysol e di Salawatty.

La costante mancanza di color rosso sulla testa delle femmine di Aru toglie ogni valore alla supposizione del Finsch che gl' individui cosifatti siano giovani.

Io ho potuto confrontare i due individui suddetti con sei altri della *C. diophthalma*, cioè con un maschio giovane di Putat presso Andai nella Nuova Guinea, con due maschi ed una femmina di Mysol, con una femmina di Kavijave (?) (*Coll. Turati*) e finalmente con un maschio di località ignota: i tre maschi adulti sono affatto simili tra loro, e differiscono dal maschio delle Isole Aru pei caratteri sopra indicati, le due femmine differiscono dai maschi per avere una sottile stria rossa, che dalle redini passando sotto l' occhio si estende fino nella regione auricolare, e per le gote grigie, leggermente giallognole, o rossigne, e marginate inferiormente dalla fascia azzurra, come nei maschi [1]; finalmente l'individuo di Putat, raccolto dal signor D' Albertis, segnato ♂, è similissimo alle femmine pel colorito; esso è un giovane, come si scorge facilmente per le sue dimensioni molto minori, per la smarginatura del becco, nella quale si distende una membrana secca, e finalmente per la superficie del suo becco, specialmente della mandibola inferiore, affatto liscia, senza strie di sorta. Questo è l' individuo menzionato dallo Sclater (*P. Z. S.* 1873, p. 697). Esso è assai interessante in quanto che dimostra che i giovani della *C. diophthalma* non mancano di rosso sulla testa, come ha supposto il Finsch.

Graucalus pollens, n. sp.

Saturate plumbeus; subalaribus concoloribus; remigibus nigricantibus, inferius canescentibus; tectricibus alarum inferioribus ma-

[1] Gl' individui cosifatti sono stati creduti giovani e non femmine adulte dal Finsch (*Papag.* II, p. 629), ma il Meyer recentemente ha dimostrato come essi siano in realtà femmine adulte (*Sitzb. der k. Akad. der Wissensch.* I, *Abth.* Marz. Heft, 1874).

joribus canis, apice subtiliter nigro-marginatis; cauda nigra, rectrice extima utrinque apice nonnihil pallente; iride, rostro, pedibusque nigris.

Mas. *Margine frontali, capitis lateribus guttureque nigris, sed non circumscripte, nitore nonnullo virescente coracino.*

Foem. *Vix pallidior; fere unicolor, loris obscurioribus.*

Long. tot. 0m, 340-0m, 355; al. 0m, 183-0m, 175; caud. 0m, 165-0m, 160; rostr. 0m, 030-0m, 028; tarsi 0m, 030-0m, 028.

Hab. Isole Kei (*D'Albertis*); Kei Bandan (*Beccari*); Kei Ralan (*Beccari*).

a. ♂. Dicembre 1872. Iride, becco e piedi neri (*D'Albertis*).

Fronte, lati della testa e gola nero lucente, con riflessi verdi.

b. 593. ♂? Kei Bandan 29 Luglio 1873.

Simile al precedente.

c. 594. ♀. Kei Bandan 29 Luglio 1873.

Differisce dal maschio pei caratteri sopra indicati.

d. 595. ♀. Kei Bandan 29 Luglio 1873.

Simile al precedente, ma le remiganti hanno un sottilissimo margine chiaro.

e. 703. ♂? Tual, Piccola Kei, Agosto 1873.
f. ♀. Kei Ralan 18 Settembre 1873.
g. ♀. Kei Ralan 21 Settembre 1873.
h. ♀. Kei Ralan 2 Ottobre 1873.

Questi tre ultimi individui sono perfettamente simili alla femmina n.° 594.

Gl'individui n.° 593 e 703 differiscono da tutti gli altri della collezione Beccari per avere, come si è detto, la fronte, i lati della testa e la gola di color nero lucente, con riflessi verdi; essi sono segnati femmine come tutti gli altri; ma temo che ciò sia avvenuto per errore, mentre quel carattere evidentemente è proprio dei maschi; inoltre essi sono similissimi all'individuo raccolto dal D'Albertis, che è indicato come maschio.

Questa specie appartiene al gruppo di quelle a piume di color plumbeo, e sembra la più grande di esse. Le due specie

cui più si avvicina sono il *Graucalus personatus* (Müll.) ed il *G. larvatus* (Müll.). Il primo ha circa 11 pollici di lunghezza totale, ed il secondo soltanto 10, mentre la mia nuova specie ne ha circa 13; inoltre il *G. personatus* ha le cuopritrici inferiori delle ali bianche, mentre il mio *G. pollens* le ha plumbee, come le piume delle altre parti del corpo, tranne le maggiori, che volgono al cenerino e sono sottilmente marginate di nero all' apice; il *G. larvatus*, ha dimensioni molto minori, ed inoltre sembra che differisca per le cuopritrici inferiori delle ali di color cenerino.

Chalcostetha chlorolaema, n. sp.

Nigra; pileo aureo-viridi; gula, uropygio, supracaudalibus, tectricibus alarum minoribus et mediis, scapularibusque splendide viridibus.

Colorito generale nero-azzurro-vellutato; pileo verde-dorato splendente; gola, groppone, sopraccoda, piccole e medie cuopritrici delle ali e scapolari di un bel verde splendente; le cuopritrici esterne delle remiganti primarie, e le timoniere marginate di verde splendente, con riflessi azzurri; becco e piedi neri.

Lungh. tot. $0^m,125$ circa; al. $0^m,060$; cod. $0^m,042$; becco $0^m,019$-$0^m,020$; tarso $0^m,016$.

Hab. Isole Kei (*Beccari*).

Il Beccari ha inviato quattro individui maschi di questa bella specie; due di Kei Ralan, raccolti il 28 Settembre ed il 5 Ottobre 1873, un terzo di Kei Bandan, ucciso il 21 Luglio 1873, ed un quarto finalmente senz' altra indicazione che quella d' Isole Kei.

Questa specie è perfettamente distinta pel bellissimo colore verde splendente puro della gola, diverso dal verde dorato del pileo, ed ugualissimo a quello del groppone, del sopraccoda e delle cuopritrici delle ali.

Chalcostetha chlorocephala, n. sp.

Nigro-cyanea; pileo obscure aeneo-viridi; tectricibus alarum minoribus et mediis, scapularibus, uropygio, supracaudalibus rectricumque marginibus splendide viridi-cyaneis; jugulo splendide purpureo, superius cyanescente; iride, rostro, pedibusque nigris.

Colorito generale nero-azzurro-vellutato; pileo verde-scuro splendente; piccole e medie cuopritrici delle ali, scapolari, groppone, sopraccoda e margine delle timoniere color verde splendente, con riflessi azzurri; gola violetta, volgente all' azzurro sui lati del mento.

Lungh. tot. 0m, 115 circa; al. 0m, 063; cod. 0m, 038; becco 0m, 018 circ. (1); tarso 0m, 14.

Hab. Wokan, Isole Aru (*Beccari*).

Il Beccari ha raccolto un solo individuo maschio di questa specie (2), la quale sembra affine alla *C. porphyrolaema* (Wall.) (P. Z. S. 1865, p. 479) di Macassar, avendo com' essa la gola di un bel color violetto splendente, ma sembra differirne pel colore del pileo verde splendente scuro, mentre è verde dorato nella *C. porphyrolaema*.

Zosterops uropygialis, n. sp.

Supra viridi-flava, pileo fusco-tincto; uropygio et gastraeo flavis.

Pileo olivastro-nereggiante (3); dorso ed ali color giallo-verdognolo, che sul groppone volge più decisamente al giallo; parti inferiori di un bel giallo, più vivo sul sottocoda; remiganti e timoniere scure, marginate di verde-giallo; cuopritrici inferiori delle ali giallo chiaro; margine interno delle remiganti bianchiccio; becco nero; piedi plumbei.

(1) Il becco manca della punta.

(2) N. 416, 28 Maggio 1863.

(3) Sul mezzo della fronte v' è una bella piuma gialla, ma sembra accidentale

Lungh. tot. $0^m,116$; al. $0^m,065$; cod. $0^m,046$; becco $0^m,013$; tarso $0^m,018$.

Hab. Piccola Kei (*Beccari*).

Il Beccari ha raccolto un solo individuo di questa specie; esso manca delle piume perioculari [1].

Sericornis beccarii, n. sp.

Fronte nigricante, utrinque albo-maculata; loris genisque nigricantibus; maculis supra et infra oculos albis; notaeo fusco-olivaceo; gastraeo albicante; gula nigro-punctulata; lateribus albo-flavidis; alis fuscis, albo-bifasciatis.

Fronte, redini e regione infraoculare nericcie; sui lati della fronte due macchie bianche, prolungate posteriormente; sopra e sotto gli occhi altre due macchie bianche; pileo bruno, coi margini delle piume tinti di nericcio, onde si produce un disegno a squame; dorso bruno-olivastro uniforme, un po' rossigno verso il sopraccoda; parti inferiori bianchiccie, con piccole macchiuzze nere sulla gola; fianchi bianco-giallognoli sudici; sottocoda bruno-chiaro; remiganti brune; cuopritrici delle ali nere, con macchie bianche all' estremità delle medie e delle grandi, onde le ali appaiono attraversate da due fascie bianche; coda bruna; iride cinnabarina; becco e piedi bruni.

Lungh. tot. $0^m,120$; ala $0^m,062$; cod. $0^m,046$; becco $0^m,013$; tarso $0^m,021$.

[1] Aggiungo la descrizione di un' altra specie di *Zosterops* di Seram-Laut:

Zosterops rufifrons, n. sp.

Viridi-flava; gastraeo medio flavo; margine frontali, mentoque rufis.

Maschio. Color generale verde-giallognolo, un po' più chiaro inferiormente; parti inferiori lungo il mezzo della gola, del petto e del ventre giallo puro; fronte e mento color bruno-rossigno; piume perioculari bianche; una macchia nericcia avanti e sotto l' occhio; remiganti e timoniere scure, marginate di verde-giallo, come le parti superiori; cuopritrici inferiori delle ali e margine interno delle remiganti bianco-giallognolo; becco scuro, colla base della mandibola chiara; piedi plumbei?

Lungh. tot. $0^m,120$; al. $0^m,063$; cod. $0^m,042$; becco $0^m,013$; tarso $0^m,018$.

Hab. Gesser. Seram Laut (*Beccari*).

Non conosco altra specie che come questa abbia la fronte ed il mento di color bruno-rossigno.

a. ♂. Wokan, Isole Aru, 7 Aprile 1873. Iride cinnabarina (*Beccari*).
b. ♂. Giabu-Lengan, Isole Aru, 23 Maggio 1873.

L' individuo di Giabu-Lengan sembra piuttosto giovane; esso ha la fronte e i lati della testa meno neri del primo, le parti inferiori più sudicie, e quasi senza tinta giallognola, le macchie all' estremità delle cuopritrici delle ali più piccole.

Questa specie somiglia alquanto alla *S. citreogularis*, Gould ed alla *S. humilis*, Gould, ma è ben distinta da ambedue.

Torino, 4 Agosto 1874.